

<h1 style="text-align: center; color: red;">MANOR</h1> <p style="text-align: center; color: red;">Independent School District</p>	<p style="text-align: right;"> Karen Mazerac, Secretary Ben Arellano, Member Desiree Cornelius-Fisher, Member Reginald Turner, Member Stan Voelker, Member </p>
<p>P.O. Box 359 Manor, Texas 78653 (512) 278-4000</p>	<p style="text-align: right;">Dr. Mark Diaz, Superintendent</p>

Health Services Tuberculosis Questionnaire

Student Name: _____ Campus: _____

Tuberculosis can be transmitted to children by adults who live with or spend a great deal of time with them. Tuberculosis is transmitted by a person who has tuberculosis to another person through airborne droplets that are coughed or sneezed into the air and then breathed in by the child. This transmission of infection is more likely to occur when the child and the infectious person spend a lot of time together in a closed environment such as a car, a small room, or other similar situations.

Adults who have Tuberculosis will often have the following symptoms: cough for more than two weeks duration, loss of appetite, weight loss of ten or more pounds over a short period of time, fever, chills and night sweats.

Children with Tuberculosis frequently do not have symptoms. A person can have a Tuberculosis infection and not have active Tuberculosis.

- Not everyone who coughs has Tuberculosis
- TB can cause fever (low grade) of long duration, unexplained weight loss, failure to maintain adequate growth in children, weakness, chest pain, a bad cough, hoarseness, and /coughing up blood.
- TB is preventable and treatable.
- Children with active TB often do not show signs of illness. Infants are more likely to have symptoms.

Date of last TB skin test: _____ Results: _____

Since your child's last TB skin test:

1. Has anyone in your family had Tuberculosis or has your child been around anyone with Tuberculosis?
2. Was your child born in or has your child traveled in a foreign country where Tuberculosis is common or have you had visitors from such a country? (Latin America including Mexico, Asia, Africa, or Eastern Europe)
3. Has your child been in contact with anyone who is at increased risk for TB infection? This includes anyone who uses IV drugs, has been in jail or prison, or has HIV disease.

Is the answer to any of the above questions yes? Yes: _____ No: _____

Parent or Guardian Signature

Date

<h1 style="color: red; margin: 0;">MANOR</h1> <h2 style="color: red; margin: 0;">Independent School District</h2>	<p style="margin: 0;">Karen Mazerac, <i>Secretary</i> Ben Arellano, <i>Member</i> Desiree Cornelius-Fisher, <i>Member</i> Reginald Turner, <i>Member</i> Stan Voelker, <i>Member</i></p>
<p>P.O. Box 359 Manor, Texas 78653 (512) 278-4000</p>	<p>Dr. Mark Diaz, Superintendent</p>

Servicios de Salud Cuestionario de Tuberculosis

Nombre de Estudiante: _____ Campus: _____

La Tuberculosis puede ser transmitida a los niños por adultos que viven o pasan la mayor parte del tiempo con los niños. La Tuberculosis es transmitida por la persona que tiene Tuberculosis a otra persona a través de la tos o destornudos en el aire que luego es respirada por el niño. Ésta transmisión de infección es más probable que ocurra cuando el niño y la persona infectada pasan mucho tiempo juntos en un ambiente cerrado como en un automóvil, un cuarto pequeño o otra situación similar.

El adulto que tiene Tuberculosis usualmente tiene los siguientes síntomas: tos que dura más de dos semanas, pérdida de apetito, pérdida de peso de diez libras o más sobre un corto periodo de tiempo, fiebre, escalofríos y fuertes sudores durante la noche.

Los niños con Tuberculosis frecuentemente no tienen síntomas. Una persona puede estar infectada con tuberculosis y no tener Tuberculosis activa.

- No todo el que tose tiene Tuberculosis.
- La Tuberculosis puede causar fiebre (de baja temperatura) de larga duración, pérdida de peso inexplicable, no poder mantener crecimiento adecuado en niños, debilidad, dolor en el pecho, tos fuerte, ronquera, toser sangre.
- La tuberculosis es prevenible y tratable.
- Los niños con Tuberculosis activa frecuentemente no demuestran señales de la enfermedad. Los bebés son más propensos a tener síntomas.

Fecha de última prueba de Tuberculosis: _____ Resultados: _____

Luego de la última prueba de tuberculosis de su niño:

1. ¿Alguien en su familia ha tenido Tuberculosis o ha estado su niño con alguien que tenga Tuberculosis?
2. ¿Ha nacido o viajado su niño a un país donde la Tuberculosis es común o ha tenido usted visitantes de tal país? (América Latina, incluyendo México, Asia, África o Europa Este)
3. ¿Ha estado su niño en contacto con alguien de alto riesgo de estar infectado con Tuberculosis? Esto incluye cualquier persona que use drogas a través de la vena, ha estado encarcelado o tiene la enfermedad HIV.

¿Ha contestado usted sí a algunas de estas preguntas mencionadas? Sí: _____ No: _____

Firma de Padres o Guardian Legal

Fecha